

ORIENTAÇÕES PARA COPROLÓGICO

1. O frasco deve ser retirado pelo Cliente em uma de nossas unidades ou adquirido em farmácias;
2. É recomendável suspender medicação laxante e/ou supositórios nos 03 (três) dias anteriores a coleta ou conforme orientação médica;
3. Evitar o uso de bebidas gasosas (Ex.: refrigerantes, água gaseificada) e alcoólicas durante os 03 (três) dias que antecedem a coleta;
4. Para maiores de 12 anos, manter dieta habitual com as recomendações descritas abaixo ou conforme orientação médica.

DIETA

1. É recomendável nos últimos 03 (três) dias antes da coleta que inclua nas refeições principais (almoço e/ou jantar) quantidades usuais de carne, batata e feijão e, nas outras refeições (café da manhã, lanche da tarde), manteiga e leite;
2. No quarto dia colher um volume fecal de no mínimo 30 gramas da primeira evacuação do dia para entregar no laboratório. Usar frascos coletores limpos e secos;
3. Evitar contaminação por urina, água, gordura ou outro elemento;
4. A amostra é estável até 02 horas após a coleta em temperatura ambiente;
5. Após este período refrigerar entre 2 e 8°C com estabilidade de 03 (três) dias refrigerado;
6. No caso de recém-nascidos e crianças, em que não obteve a quantidade desejável, recomendamos a coleta de mais de uma evacuação realizadas no mesmo dia mantidas refrigeradas em um único frasco, totalizando uma quantidade de 15-30 gramas.

* Imagem meramente **ilustrativa**.

